



TARGET

Keep Antibiotics Working



Kaip paimti šlapimo mėginį naudojant įklotus arba surinkimo maišelius

kūdikiams ir mažiems vaikams

Šlapimo surinkimo maišeliai



1

Prieš imdami mėginį ir po to nusiplaukite rankas muilu bei vandeniu.




2

Nuvalykite ir nusauskinkite vaiko lytinių organų sritį.



3

Priklijuokite maišelį sandariai prie odos aplink lytinius organus, tuomet uždėkite sauskelnes.



4

Kai vaikas baigia šlapintis, nusiplaukite rankas, atsargiai nuimkite maišelį, nukirpkite kampą ir supilkite šlapimą į sterilų indelį. Saugokite, kad maišelis neprisiliestų prie indelio vidaus.



5


Iš karto uždėkite dangtelį ant indelio ir tvirtai jį užsukite.

Šlapimo surinkimo įklotai



1

Prieš imdami mėginį ir po jo — nusiplaukite rankas.



2

Įdėkite įklotą į sauskelnes ir leiskite vaikui jas dėvėti kaip įprasta. Tikrinkite kas 10 minučių, ar įklotas sudrėko. Nelaikykite įklotu ilgiau nei 30 minučių, nes taip padidėja rizika, kad į mėginį pateks mikrobus.




3

Procesą pradėkite iš naujo kas 30 minučių, naudodami naują įklotą, arba pakeiskite jį iš karto, jei vaikas pasituština — kartokite, kol vaikas pasišlapins į vieną iš įklotų.



4

Prieš nuimdami įklotą nusiplaukite rankas. Naudokite pridėtą švirkštą, kad ištrauktumėte šlapimą iš įklotu ir perkeltumėte jį į sterilų indelį. Nelieskite indelio vidaus švirkštu.



5

Iš karto uždėkite dangtelį ant talpyklos ir gerai jį užsukite.



6

Nenaudokite vatos, marlės ar kitų įklotų, nes jie gali paveikti tyrimo rezultatus.

Bendrieji patarimai

- Prieš rinkdami mėginį nuvalykite ir nusauskite vaiko lytinius organus.
- **Visada nusiplaukite rankas** muilu ir vandeniu prieš imdami šlapimo mėginį ir po jo.
- **Neatidarykite sterilaus indelio**, kol nebūsime pasiruošę paimti mėginio.
- **Įklotus ar maišelius naudokite tik tuo atveju**, jei juos jums davė

sveikatos priežiūros specialistas ir paaiškino, kaip jais naudotis. Laikykitės visų jums pateiktų nurodymų.

- **Stenkitės nelieskite indo vidaus ir** neleiskite, kad vaiko lytiniai organai prie jo prisiliestų.
- **Prieš imdami mėginį, paženklinkite indelį**, jei sveikatos priežiūros specialistas to paprašė.

Informacijos santrauka

Kodėl reikia tiksliai laikytis nurodymų, kai naudojate priemonės šlapimo mėginiui paimti?

Tinkamai atliekant visus žingsnius, padedama išvengti mikrobų patekimo į mėginį, todėl rezultatai būna patikimesni.

Ar galiu naudoti stiklainį ar indelį, kurį turiu namuose?

Mėginiui paimti turėtumėte naudoti indelį, kurį jums pateikė sveikatos priežiūros specialistas.

Ar svarbu, kada paimsiu mėginį?

Stenkitės paimti mėginį kuo arčiau savo vizito laiko, kad gautumėte geriausios kokybės mėginį.

Skenuokite kodą ir sužinokite daugiau informacijos



Patarimai, kaip pristatyti šlapimo mėginį

- ✓ **Paskubėkite pristatyti mėginį**
Kuo greičiau pristatykite jį sveikatos priežiūros specialistui – idealiai per dvi valandas.
- ✓ **Laikykite mėginį šaltai**
Jei negalite greitai pristatyti mėginio, įdėkite indelį į plastikinį maišelį ir laikykite šaldytuve, iki kol galėsite jį pristatyti.
- ✓ **Patikrinkite priėmimo laikus**
Pasiteiraukite, koks yra vėliausias mėginių priėmimo laikas, kad mėginys tą pačią dieną pasiektų laboratoriją.
- ✓ **Naudokite specialius sterilius indelius**
Kai kuriuose indeliuose yra konservanto miltelių ir pažymėta užpildymo linija. Stenkitės pripildyti iki nurodytos linijos, bet jei nepavyksta, tiesiog surinkite tiek šlapimo, kiek galite.