

मैं अपने सामान्य संक्रमण (इंफेक्शन) से कैसे निबट सकता/सकती हूँ?

16 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए पत्रिका


1 सामान्य संक्रमण के क्या लक्षण हैं?

आंखें

- आंखों का लाल होना
- आंखों में चिपचिपाहट
- आंखों में जलन या किरकिरापन महसूस होना

छाती

- खांसी
- सांस लेने में कठिनाई
- हरा या पीला जैसा बलगम निकलना



कान, नाक और गला

- दर्द या खराश
- बंद नाक या नाक बहना
- टॉन्सिल फूलना

आंत

- जी मिचलाना
- उल्टी
- दस्त

2 मेरा संक्रमण कितना सामान्य है?

यूके में हर साल...


वयस्कों को औसतन 2 से 3 बार सर्दी-जुकाम होता है
(बच्चों में अधिक सामान्य है)



5 में से 1 व्यक्ति को आंतों का संक्रमण होता है



10 में से हर 1 व्यक्ति को साइनस इंफेक्शन होता है



3 सामान्य संक्रमण का इलाज मैं कैसे कर सकता/सकती हूं?



जब तक आप बेहतर महसूस न करें तब तक **पर्याप्त आराम करें**।



जरूरी हो तो **दर्द-निवारक दवा लें** (निर्देशों के पालन का ध्यान रखें)।



निर्जलीकरण से बचने के लिए **पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ** (6 से 8 कप या गिलास) पीएं और नियमित रूप से पेशाब करते रहना सुनिश्चित करें।



खांसी के लिए शहद और खांसी की दवा का प्रयोग करें।
गले में खराश होने पर, औषधियुक्त लॉजेंस और दर्द-निवारक दवा का प्रयोग करें।



आंखों के संक्रमण को ठीक करने के लिए, उबाल कर ठंडा किए गए पानी में साफ कपड़े को भिगो कर आंखों के आस-पास हल्का-हल्का पोछें।



बाहरी कान के संक्रमण के लिए, बिना पर्ची के मिलने वाले डयर-ड्रॉप्स आजमाएं।

4 मेरा संक्रमण कब तक रह सकता है?

खांसी



3 से 4
सप्ताह

गले में खराश या
कान में दर्द



7 से 8
दिन

साधारण
सर्दी-जुकाम



14
दिन

नोरोवायरस (सर्दियों
में होने वाली उल्टी)



2 से 3
दिन

साइनस
इंफेक्शन



3 से 4
सप्ताह

आंखों का
संक्रमण



7 से 14
दिन

यदि आपके लक्षण बदतर हो रहे हैं या आप उपरोक्त अवधि में ठीक नहीं हो जाते हैं तो अपने सामान्य चिकित्सक (GP) से सम्पर्क करें।

सामान्य संक्रमणों पर अपनी स्वयं देखभाल सम्बंधी सलाह के लिए www.nhs.uk देखें

5 क्या मेरे संक्रमण के ठीक होने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों की जरूरत होगी?

- साधारणतः, आपका शरीर सामान्य संक्रमणों से स्वयं लड़ सकता है।
- जब तक बैक्टीरिया संक्रमण के लक्षण गंभीर न हों, आपको सामान्यतः एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है - इस बारे में अपने प्रोफेशनल स्वास्थ्यकर्मी की सलाह का पालन करें।
- जरूरत न होने पर भी एंटीबायोटिक्स लेने से आप और आपका परिवार खतरे में पड़ सकता है।
- एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में अपने प्रोफेशनल स्वास्थ्यकर्मी की सलाह का पालन करें।
- एंटीबायोटिक्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.antibioticguardian.com पर जाएं।

6 मैं अपने संक्रमण को फैलने से कैसे रोक सकता/सकती हूँ?

यदि आपको खांसना या छींकना हो तो:



रोकें

टिशू (या कोहनी के भीतरी हिस्से) का प्रयोग करें



कूड़ेदान में डालें
उपयोग किया गया टिशू कूड़ेदान में फेंक दें



मार दें
अपने हाथों को साफ करके

साबुन और पानी या हैंड सैनिटाइज़र से कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को साफ करें:

- भोजन तैयार करने और खाने से पहले
- शौचालय का उपयोग करने के बाद
- पालतू जानवरों या पशुओं को छूने के बाद
- घर से निकलते समय और घर पहुंच कर



अपनी आंखों, नाक या मुंह को गंदे हाथों से न छुएं। संभव हो तो दूसरे लोगों से कम से कम 2 मीटर (6 फीट) की दूरी बनाए रखें, खास तौर पर अपने घर के कमज़ोर लोगों से।



अपने मुंह के संसर्ग में आने वाली वस्तुओं, जैसे खाने के बर्तन और टूथब्रश, को किसी से साझा न करें।



समय-समय पर अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाते रहें। यदि आप पात्र हैं तो हमेशा शीतकालीन टीके लगवाएं (जैसे: फ्लू के टीके)।

सामान्य संक्रमणों के बारे में और अधिक सलाह के लिए फार्मसी पर जाएं या कॉल करें

7 मुझे गंभीर बीमारी के किन लक्षणों पर ध्यान रखना चाहिए?



तेज सिरदर्द और उल्टी



सामान्य से अधिक तेज या धीमी गति से सांस लेना, सीने में दर्द या जकड़न



लगातार बुखार या कंपकंपी (38°C से ज्यादा या 36°C से कम तापमान)



आपकी पसलियों के ठीक नीचे पीठ में गुर्दे (किडनी) में दर्द



निगलने में समस्या



नाड़ी की बहुत तेज या मंद गति जो पहले नहीं थी



खांसी में खून आना



त्वचा का बहुत ठंडा पड़ना

यदि आपमें उपरोक्त लक्षण हों तो तुरन्त अपने सामान्य चिकित्सक (GP) से सम्पर्क करें या अपने क्षेत्र की निम्नांकित सेवाओं का उपयोग करें।

NHS England



NHS 111
Wales



NHS Scotland



Northern
Ireland

Contact your
GP practice



आपके लिए आवश्यक होने पर, इन सेवाओं द्वारा गोपनीय दुभाषिया उपलब्ध कराया जा सकता है।

8 यदि मुझे सेप्सिस के लक्षण दिखें तो क्या होगा?

घाव का सड़ जाना (सेप्सिस) किसी भी संक्रमण के कारण होने वाली जानलेवा प्रतिक्रिया है। इसके संभावित संकेत हैं:

- बोली का अस्पष्ट होना, भ्रम या उर्नीदापन
- अत्यधिक कंपकंपी
- दिन भर पेशाब न होना
- गंभीर रूप से सांस फूलना
- ऐसा महसूस होना कि आप मरने वाले हैं, और
- त्वचा का धब्बेदार या बदरंग होना।

यदि आपको सेप्सिस का संदेह हो तो 999 पर तुरन्त फोन करें