

پیشاب کی نالی کی عفونتیں

بزرگ بالغوں اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے
دستی پرچہ



TARGET

Keep Antibiotics Working


پیشاب کی عفونت کیا ہے؟

پیشاب کی عفونت اس وقت ہوتی ہے جب پیشاب کے نظام کے کسی بھی حصے میں بیکٹیریا علامات مرض کا سبب بنتے ہیں۔

اگر پیشاب کی ایک جانچ میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں لیکن آپ بصورت دیگر ٹھیک ہیں، تو پریشان مت ہوں، یہ عام بات ہے، اور عام طور پر اینٹی بائیوٹک ادویات کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم، پیشاب کی سنگین عفونتیں زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔

آپ پیشاب کی عفونت سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟

کیا آپ کافی مقدار میں پینے والی چیزیں پی رہے ہیں؟ اپنے پیشاب کا رنگ دیکھیں۔



- گردے پیشاب بنتے ہیں
- مثانہ پیشاب کو ذخیرہ کرتا ہے
- پیشاب کی نالی پیشاب کو جسم سے باہر نکالتی ہے



• کافی مقدار میں سیال مواد پینیں (6-8 گالس) تاکہ آپ کو دن کے دوران باقاعدگی سے ہلکے پہلے رنگ کا پیشاب آئے، اور پیاس محسوس کرنے سے بچ جائیں، خصوصاً گرم موسم کے

دوران۔

- سوڈے والے مشروبات یا الکحل بہت زیادہ پینے سے اجتناب کریں
- کروندے کے پہل کی مصنوعات یا ورم مٹانے کے سائے کا کوئی ثابت شدہ فائدہ نہیں ہے
- قبض سے بچیں۔ اگر ضرورت ہو تو مشورہ لیں
- ذیابیطس پر اچھا قابو برقرار رکھیں

اپنی آنت سے بیکٹیریا کو اپنے مٹانے میں پھیلنے سے روکیں:

- رفع حاجب کے بعد اعضائے مخصوصہ کو سامنے سے پیچھے تک صاف کریں
- اگر پیٹ گندے ہو جائیں تو تبدیل کریں اور اعضائے مخصوصہ کو صاف کریں
- اعضائے مخصوصہ کے حصے کو صاف اور خشک رکھیں؛ خوشبودار صابنوں سے اجتناب کریں

• مباشرت سے پہلے اور بعد میں پانی سے دھوئیں

ایک جی پی کے پاس بھجوانے یا دیگر عاجوں کے متعلق اپنے دواساز سے بات کریں۔

آپ کو کن نشانیوں اور علامات مرض کو دیکھنا چاہیے؟

اگر آپ کو پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے تو ان علامات مرض پر غور کریں:

- کپکپی یا لرزہ
- بلند یا پست درجہ حرارت
- پسلیوں کے بالکل نیچے آپ کی کمر میں درد گردہ



تمام لوگوں میں پیشاب کی عفونت کی نئی یا بدتر ہوتی نشانیاں:

- پیشاب کرتے وقت درد یا جلن
- بلند یا پست درجہ حرارت
- کپکپی یا لرزہ
- عجلت (فوری طور پر پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہونا)
- پیٹ کے نچلے حصے میں زیر ناف بالوں سے اوپر والے حصے میں درد ہونا
- ضعف ضبط (معمول سے زیادہ کثرت سے پیشاب خطا ہونا)
- معمول سے زیادہ کثرت سے پیشاب کرنا
- دھندلے پیشاب، یا آپ کے پیشاب میں واضح طور پر خون کا ہونا
- الجھن، رویے میں تبدیلی، یا پیروں میں لڑکھڑاہٹ

ی عفونت کی وجہ سے ہوتی ہے، دیگر چیزوں پر بھی غور کریں جو الجھن ہونے کا سبب بن سکتی ہیں

- دوا کے مضر اثرات
- قیض
- دیگر عفونت
- خراب نیند
- آپ کے معمول یا گھر کے ماحول میں تبدیلی
- پڑمردگی
- ناقص غذا
- کافی زیادہ پانی نہ پینا

اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کووڈ-19 ہے تو براہ مہربانی تازہ ترین گائڈنس اور معلومات کے لیے GOV.UK کے کورونا وائرس سیکشن اور NHS پر جائیں۔

آپ بہتر محسوس کرنے میں مدد کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟

- کروندے کے پھل کی مصنوعات یا ورم مٹانہ کے سائے کا کوئی ثابت شدہ فائدہ نہیں ہے
- اگر آپ کو اپنا پیشاب خطا ہونے کے متعلق پریشانی ہے، تو اپنے مشورہ لینے کے لیے اپنے معالج یا نرس سے رجوع کریں
- اپنے دواساز/دیکھ بھال کرنے والے سے مشورہ لیں

- کافی مقدار میں سیال مواد پینیں تاکہ آپ کو دن کے دوران، خصوصاً گرم موسم کے دوران باقاعدگی سے پیشاب آنے
- باقاعدگی سے پیراسٹامول لیں، روزانہ 4 مرتبہ بخار اور درد سے آرام کے لیے



- پیاس محسوس کرنے سے اجتناب کرنے اور اپنے پیشاب کو ہلکے پہلے رنگ کا رکھنے کے لیے کافی مقدار میں سیال مواد پئیں

آپ کا دواساز / نرس / معالج کیا کر سکتے ہیں؟

- اگر آپ کی علامات مرض کا اپنے آپ بہتر ہونے کا امکان ہے تو آپ اپنی دیکھ بھال کرنے کا مشورہ اور درد سے آرام حاصل کر سکتے ہیں



- آپ کو زیادہ سیال مواد پینے کو کہیں
- آپ سے پیشاب کا ایک نمونہ دینے کو کہیں
- آپ کو ایک اینٹی بائیوٹک دی جا سکتی ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی علامات مرض بہتر نہیں ہوتیں یا آپ بدتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں

اینٹی بائیوٹکس کے متعلق ہمیشہ اپنے دواساز کے / نرس کے / معالج کے مشورے پر اعتماد کریں

- اینٹی بائیوٹکس آپ کی آنت میں بیکٹیریا کو متاثر کرتی ہیں، جو انہیں کم از کم ایک سال کے لیے اینٹی بائیوٹکس کی مزاحم بنا سکتی ہیں

- اینٹی بائیوٹکس پیشاب کی سنگین عفونتوں کے لیے زندگی بچانے والی ہو سکتی ہیں
- لیکن پیشاب کی علامات مرض کے لیے اینٹی بائیوٹکس کی ہمیشہ ضرورت نہیں ہوتی
- اینٹی بائیوٹکس لینے کے عمومی مضر اثرات

- اینٹی بائیوٹکس کو کارگر رکھیں، انہیں صرف تہی لیں جب آپ کا معالج/نرس انہیں تجویز کریں

- میں منہ میں چھالے بنا، چھپاکی، قے آنا اور پیچش شامل ہیں؛ اگر آپ پریشان ہیں تو مشورہ لیں

آپ کو مدد کب لینی چاہیے؟

مندرجہ ذیل علامات مرض سنگین عفونت کی ممکنہ نشانیاں ہیں اور ان کی فوری تشخیص ہونی چاہیے:

اپنی جی پی پریکٹس سے رابطہ کریں یا این ایچ ایس 111 (انگلینڈ)، این ایچ ایس 24 (سکاٹ لینڈ 111 ڈائل کریں)، این ایچ ایس ڈائریکٹ (ویلز 0845 4647 ڈائل کریں)، یا جی پی پریکٹس) (این آئی) سے رابطہ کریں



بہت الجھن، غنودگی یا
بولنے میں بڑبڑاہٹ
محسوس کرنا



کپکپانا، ٹھٹھہرنا اور
پٹھوں کا درد



درجہ حرارت
38°C سے اوپر یا
36°C سے کم ہے



پورا دن پیشاب نہ آنا



پسلیوں کے بالکل نیچے
آپ کی کمر میں درد
گردہ



سانس لینے میں
مشکل



بہت سرد جلد



آپ کے پیشاب میں
واضح طور پر خون
ہونا

علامت مرض بہت بدتر ہو رہی ہیں، یا اینٹی بائیوٹکس شروع کرنے کے 2 دن کے اندر اندر بہتر ہونا شروع نہیں ہو رہیں۔

اپنی جبلت پر بھروسہ کریں، اگر آپ کو یقین نہیں کہ
علامت مرض کتنی فوری نوعیت کی ہیں تو مشورہ لیں۔